

## Atorvastatina Vitória 10 mg comprimidos revestidos por película

## Atorvastatina Vitória 20 mg comprimidos revestidos por película

## Atorvastatina Vitória 40 mg comprimidos revestidos por película

atorvastatina

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.**

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

### O que contém este folheto:

1. O que é Atorvastatina Vitória e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Atorvastatina Vitória
3. Como tomar Atorvastatina Vitória
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Atorvastatina Vitória
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que é Atorvastatina Vitória e para que é utilizado

Atorvastatina Vitória pertence a um grupo de medicamentos chamado estatinas, que se destinam a regular a concentração de lípidos (gorduras).

Atorvastatina Vitória é usado na redução dos lípidos no sangue conhecidos como colesterol e triglicéridos, quando a dieta pobre em gorduras e as alterações do estilo de vida por si só não resultaram. Se tem um risco aumentado de doença cardíaca, Atorvastatina Vitória também pode ser utilizado para reduzir este risco, mesmo que os seus níveis de colesterol sejam normais. Durante o tratamento deve ser seguida uma dieta pobre em colesterol.

### 2. O que precisa de saber antes de tomar Atorvastatina Vitória

#### Não tome Atorvastatina Vitória

- se tem alergia (hipersensibilidade) à atorvastatina ou a qualquer ou a qualquer outro medicamento similar utilizado para diminuir os lípidos no sangue ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicado na secção 6);
- se sofre ou sofreu no passado de doença no fígado;
- se já teve os valores das análises da função do fígado alterados por motivos indeterminados;
- se é uma mulher em risco de engravidar e não está a utilizar métodos contraceptivos adequados;
- se está grávida ou a tentar engravidar;
- se está a amamentar;
- se utilizar a associação de glecaprevir/pibrentasvir no tratamento da hepatite C.

#### Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Atorvastatina Vitória.

#### Atorvastatina Vitória pode não ser indicado para si pelas seguintes razões:

- se teve um acidente vascular cerebral prévio com hemorragia no cérebro, ou se tem pequenas acumulações de líquido no cérebro resultantes de acidentes vasculares cerebrais anteriores;
- se tem problemas nos rins;
- se a sua tireoide é pouco ativa (hipotireoidismo);
- se tem dores musculares repetidas ou sem explicação aparente, antecedentes pessoais ou familiares de problemas musculares;
- se teve problemas musculares anteriores durante o tratamento com outros medicamentos que diminuem os lípidos (por exemplo, outras estatinas ou fibratos);
- se consome regularmente quantidades consideráveis de bebidas alcoólicas;
- se tem antecedentes de doença do fígado;
- se tem mais de 70 anos.
- se tem ou teve miastenia (uma doença que causa fraqueza muscular generalizada, incluindo, em alguns casos, os músculos utilizados durante a respiração) ou miastenia ocular (uma doença que causa fraqueza muscular ocular), uma vez que as estatinas podem, por vezes, agravar a doença ou levar à ocorrência de miastenia (ver secção 4).

#### Antes de tomar Atorvastatina Vitória verifique com o seu médico ou farmacêutico:

- se tem insuficiência respiratória grave.

Se alguma destas situações se aplicar a si, o seu médico irá fazer-lhe uma análise ao sangue antes e provavelmente durante o tratamento com Atorvastatina Vitória de forma a determinar o seu risco de efeitos indesejáveis relacionados com os músculos. Sabe-se que o risco de desenvolver efeitos indesejáveis relacionados com os músculos, por exemplo rhabdomiólise, aumenta quando alguns medicamentos são tomados ao mesmo tempo (ver secção 2 "Outros medicamentos e Atorvastatina Vitória").

Informe igualmente o seu médico ou farmacêutico se sentir uma fraqueza muscular constante. Podem ser necessários testes ou medicamentos adicionais para diagnosticar e tratar este problema.

Se tem diabetes ou está em risco de desenvolver diabetes, o seu médico irá monitorizá-lo cuidadosamente enquanto estiver a tomar este medicamento. Está em risco de desenvolver diabetes se tem níveis de açúcar e gorduras no sangue elevados, tem excesso de peso e tem pressão arterial elevada.

### Outros medicamentos e Atorvastatina Vitória

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos. Existem alguns medicamentos que podem alterar o efeito de Atorvastatina Vitória ou podem ver alterado o seu efeito por Atorvastatina Vitória. Este tipo de interação pode fazer com que um ou os dois medicamentos sejam menos eficazes. Alternativamente, pode também aumentar o risco ou a gravidade dos efeitos indesejáveis, incluindo a importante condição debilitante dos músculos conhecida como rhabdomiólise descrita na secção 4:

- Medicamentos utilizados para alterar a forma como o seu sistema imunitário funciona, por exemplo, ciclosporina;
- Alguns medicamentos antibióticos ou antifúngicos, por exemplo, eritromicina, claritromicina, telitromicina, cetoconazol, itraconazol, voriconazol, fluconazol, posaconazol, rifampicina, ácido fusídico;
- Outros medicamentos utilizados para regular os níveis lipídicos, por exemplo, gemfibrozil, outros fibratos, colestipol;
- Alguns bloqueadores dos canais de cálcio utilizados para a angina (dor no peito) ou tensão arterial elevada, por exemplo, amlodipina, diltiazem; medicamentos utilizados para controlar o seu ritmo cardíaco, por exemplo, digoxina, verapamilo, amiodarona;
- Medicamentos utilizados no tratamento do VIH por exemplo ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, a combinação tripanavir/ritonavir, etc.;
- Alguns medicamentos utilizados no tratamento da hepatite C, por exemplo, telaprevir, boceprevir e a associação de elbasvir/grazoprevir;
- Daptomicina (um medicamento utilizado para tratar infeções complicadas da pele e estruturas da pele e bactérias presentes no sangue);
- Outros medicamentos conhecidos por interagirem com a Atorvastatina Vitória incluem ezetimiba (que diminui o colesterol), varfarina (que reduz a coagulação sanguínea), contraceptivos orais, estiripentol (um anticonvulsivante para a epilepsia), cimetidina (utilizada na azia e úlceras pépticas), fenazona (analgésico), colquicina (utilizada para tratar a gota) e antiácidos (substâncias para a indigestão que contêm alumínio ou magnésio);
- Medicamentos obtidos sem receita médica: hipericão.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

### Atorvastatina Vitória com alimentos, bebidas

Para instruções sobre como tomar Atorvastatina Vitória ver secção 3. Tenha, por favor, atenção ao seguinte:

#### Sumo de toranja

Não tome mais do que um ou dois copos pequenos de sumo de toranja por dia, uma vez que grandes quantidades de sumo de toranja podem alterar os efeitos de Atorvastatina Vitória.

#### Álcool

Evite beber muitas bebidas alcoólicas enquanto toma este medicamento. Ver secção 2. "Advertências e precauções" para mais informações.

### Gravidez e amamentação

Não tome Atorvastatina Vitória se está grávida ou se está a tentar engravidar.

Não tome Atorvastatina Vitória se estiver em risco de engravidar, e não utilizar métodos contraceptivos eficazes.

Não tome Atorvastatina Vitória se estiver a amamentar.

A segurança de Atorvastatina Vitória durante a gravidez e durante o aleitamento ainda não foi estabelecida.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

### Condução de veículos e utilização de máquinas

Normalmente este medicamento não afeta a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. No entanto, não conduza caso este medicamento afete a sua capacidade para conduzir. Não utilize quaisquer ferramentas ou máquinas caso este medicamento afete a sua capacidade de as utilizar.

### Excipientes

Atorvastatina Vitória contém lactose e sacarose. Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Atorvastatina Vitória contém sódio. Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é praticamente "isento de sódio".

### 3. Como tomar Atorvastatina Vitória

Antes de iniciar o tratamento, o seu médico irá

prescrever-lhe uma dieta pobre em colesterol, a qual deverá também manter enquanto tomar Atorvastatina Vitória.

A dose inicial recomendada de Atorvastatina Vitória é 10 mg, uma vez ao dia em adultos e crianças com idade igual ou superior a 10 anos. Se necessário, o seu médico poderá aumentar a sua dose, até ser atingida a dose que necessita. O seu médico irá ajustar a dose em intervalos de 4 semanas ou mais. A dose máxima de Atorvastatina Vitória é de 80 mg uma vez ao dia para adultos e 20 mg uma vez ao dia para crianças.

Atorvastatina Vitória comprimidos devem ser tomados inteiros, com um copo de água, a qualquer momento do dia, com ou sem comida. No entanto, deverá fazer um esforço para tomar o seu comprimido à mesma hora todos os dias.

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas

A duração do tratamento com Atorvastatina Vitória deve ser definida pelo seu médico.

Informe o seu médico se sente que o efeito de Atorvastatina Vitória é muito fraco ou muito forte.

#### **Se tomar mais Atorvastatina Vitória do que deveria**

Se tomou, acidentalmente, muitos comprimidos de Atorvastatina Vitória (mais do que a sua dose diária habitual), informe o seu médico ou contacte o hospital mais próximo para ser aconselhado.

#### **Caso se tenha esquecido de tomar Atorvastatina Vitória**

Se se esqueceu de tomar o medicamento, deverá tomar a dose seguinte à hora normal. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

#### **Se parar de tomar Atorvastatina Vitória**

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento ou se deseja parar o tratamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### **4. Efeitos indesejáveis possíveis**

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Se verificar algum dos seguintes efeitos indesejáveis graves, pare de tomar os seus comprimidos e fale imediatamente com o seu médico ou dirija-se às urgências do hospital mais próximo.

*Raros (podem afetar 1 a 10 pessoas em 10.000):*

- Reação alérgica grave que causa inchaço da face, língua e garganta que pode provocar dificuldade em respirar.
- Doença grave com descamação grave e inchaço da pele, formação de bolhas na pele, boca, olhos, genitais e febre. Erupção na pele com manchas rosa avermelhadas especialmente nas palmas das mãos ou nas solas dos pés, que podem tornar-se bolhosas.
- Fraqueza, sensibilidade ou dor muscular e particularmente, se em simultâneo, se se sentir indisposto ou com temperatura corporal elevada, pode ser devido a um colapso muscular anómalo. O colapso muscular anómalo nem sempre desaparece, mesmo depois de ter deixado de tomar atorvastatina, e que pode colocar a vida em risco e levar a problemas nos rins.

*Muito raros (podem afetar menos que 1 pessoa em 10.000):*

- Se desenvolver hematomas ou hemorragias não esperadas ou não habituais, pode estar subjacente um problema do fígado. Deve informar o quanto antes o seu médico.

Outros efeitos indesejáveis possíveis com Atorvastatina Vitória:

*Os efeitos indesejáveis frequentes (podem afetar 1 a 10 pessoas em 100) incluem:*

- inflamação das fossas nasais, dor na garganta e sangramento nasal,
- reações alérgicas,
- aumento dos níveis de açúcar no sangue (se tem diabetes continue a controlar os seus níveis de açúcar no sangue), aumento da creatinaquinase no sangue,
- dor de cabeça,
- náuseas, obstipação (prisão de ventre), flatulência (libertação de gases com mais frequência), má digestão, diarreia,
- dor nas articulações, nos músculos e nas costas,
- resultados de análises ao sangue que mostram que a função do seu fígado pode sofrer alterações.

*Os efeitos indesejáveis pouco frequentes (podem afetar 1 a 10 pessoas em 1000) incluem:*

- anorexia (disfunção alimentar que envolve a perda de apetite), aumento de peso, diminuição dos níveis de açúcar no sangue (se tem diabetes deve continuar a monitorizar cuidadosamente os seus níveis de açúcar no sangue),
- pesadelos, insónias (problemas em dormir),
- tonturas, dormência ou formigueiro nos dedos das mãos ou dos pés, redução da sensibilidade da pele ao toque ou à dor, alteração do paladar, perda de memória,
- visão turva,
- zumbidos nos ouvidos e/ou cabeça,
- vômitos, arrotos, dor de barriga superior e inferior, pancreatite (inflamação do pâncreas que origina dor no estômago),
- hepatite (inflamação do fígado),
- erupção, erupção cutânea e comichão, urticária, queda de cabelo,
- dor no pescoço, fadiga muscular,
- fadiga, má disposição, fraqueza, dor no peito, inchaço especialmente nos tornozelos (edema), aumento da temperatura corporal,
- análises à urina com resultados positivos quanto à presença de glóbulos brancos.

*Os efeitos indesejáveis raros (podem afetar 1 a 10 pessoas em 10.000) incluem:*

- distúrbios visuais,

- hematomas ou hemorragias não esperadas,
- colestase (amarelecimento da pele e da zona branca do olho),
- lesão nos tendões.
- erupção que pode ocorrer na pele ou feridas na boca (reação liquenoide a medicamentos)
- lesões roxas na pele (sinais de inflamação dos vasos sanguíneos, vasculite).

*Os efeitos indesejáveis muito raros (podem afetar menos que 1 pessoa em 10.000) incluem:*

- reação alérgica – os sintomas podem incluir respiração sonora, aperto ou dor no peito, inchaço das pálpebras, face, lábios, boca, língua ou garganta, dificuldade respiratória, colapso,
- perda de audição,
- ginecomastia (aumento mamário nos homens).

*Efeitos indesejáveis de frequência desconhecida:*

- fraqueza muscular constante,
- miastenia grave (uma doença que causa fraqueza muscular generalizada, incluindo, em alguns casos, os músculos utilizados durante a respiração),
- miastenia ocular (uma doença que causa fraqueza muscular ocular).

Fale com o seu médico se sentir fraqueza nos braços ou pernas que piore após períodos de atividade, visão dupla ou pálpebras descaídas, dificuldade em engolir ou falta de ar.

*Efeitos indesejáveis possíveis comunicados após a utilização de algumas estatinas (medicamentos do mesmo tipo):*

- dificuldades sexuais,
- depressão (sensação de tristeza),
- problemas respiratórios incluindo tosse persistente e/ou falta de ar ou febre,
- diabetes – este efeito é mais provável se tem níveis de açúcar e gorduras no sangue elevados, tem excesso de peso e tem pressão arterial elevada. O seu médico irá monitorizá-lo enquanto estiver a tomar este medicamento.

### **Comunicação de efeitos indesejáveis**

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet:

<http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissao> (preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos  
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53  
1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt)

### **5. Como conservar Atorvastatina Vitória**

Não conservar acima de 30 °C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza.

Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

### **6. Conteúdo da embalagem e outras informações**

#### **Qual a composição de Atorvastatina Vitória**

A substância ativa é a atorvastatina. Cada comprimido revestido por película contém 10,3 mg, 20,7 mg, 41,4 mg de atorvastatina cálcica equivalente a 10 mg, 20 mg, 40 mg de atorvastatina base, respetivamente.

#### **Os outros componentes são:**

- Núcleo: lactose mono-hidratada, estearato de magnésio, laurilsulfato de sódio, celulose microcristalina siliciada, butil-hidroxi-anisol (E320), crospovidona, bicarbonato de sódio, estearato de polietilenoglicol 40, sacarose, triestearato de sorbitano, dimeticone 400, sílica coloidal anidra e bronopol.
- Revestimento: lactose mono-hidratada, hipromelose 15 cps, dióxido de titânio (E171) e macrogol 400.

#### **Qual o aspeto de Atorvastatina Vitória conteúdo da embalagem**

Comprimidos revestidos por película brancos, cilíndricos, biconvexos e ranhurados, acondicionados em blisters de Alumínio/Alumínio, em embalagens de 14, 28 ou 56 comprimidos.

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

#### **Titular da Autorização de Introdução no Mercado**

Faes Farma Portugal, S.A.  
Rua Elias Garcia, 28  
2700-327 Amadora • Portugal

#### **Fabricantes:**

Laboratorios Cinfa, S.A.  
Carretera Olaz-Chipi, 10 - Polígono Industrial Areta  
31620 Huarte - Pamplona • Espanha

Galenicum Health, S.L.  
Avda. Cornellá 144, 7º-1º  
Edifício LEKLA  
Esplugues de Llobregat, 08950 Barcelona  
Espanha

**Este folheto foi revisto pela última vez em outubro de 2024.**