

Montelucaste Vitória

5 mg comprimidos para mastigar

montelucaste

Leia com atenção todo este folheto antes de você ou a sua criança começarem a tomar este medicamento pois contém informação importante para si ou para a sua criança.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si ou para a sua criança. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença que você ou a sua criança.
- Se tiver, ou a sua criança tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Montelucaste Vitória e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Montelucaste Vitória
3. Como tomar Montelucaste Vitória
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Montelucaste Vitória
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

- Qualquer doente que esteja a tomar medicamentos para a asma deve ter em atenção que deverá consultar o médico se desenvolver um conjunto de sintomas, que incluem um estado semelhante a gripe, sensação de dormência e picadas nos braços ou pernas, agravamento de sintomas pulmonares e/ou erupção na pele.
- Não tome nem dê à sua criança ácido acetilsalicílico (aspirina) ou medicamentos anti-inflamatórios (também conhecidos como medicamentos anti-inflamatórios não esteroides ou AINEs) se estes agravarem a asma.

1. O que é Montelucaste Vitória e para que é utilizado

O que é Montelucaste Vitória

Montelucaste Vitória é um medicamento do grupo dos antagonistas dos receptores dos leucotrienos, que bloqueia as substâncias denominadas leucotrienos.

Como atua Montelucaste Vitória

Os leucotrienos são responsáveis pelo estreitamento e inchaço das vias respiratórias dos pulmões. Através do bloqueio dos leucotrienos, Montelucaste Vitória melhora os sintomas da asma e ajuda a controlar a asma.

Quando deve Montelucaste Vitória ser utilizado

O seu médico receitou Montelucaste Vitória para tratar a asma, prevenindo os sintomas asmáticos durante o dia e a noite.

- Montelucaste Vitória é usado no tratamento de doentes pediátricos dos 6 aos 14 anos que não estão controlados de forma adequada com a medicação que usam, e necessitam de terapêutica adicional.
- Montelucaste Vitória pode também ser usado como tratamento alternativo aos corticosteroides inalados em doentes dos 6 aos 14 anos que não tenham tomado recentemente corticosteroides por via oral para a asma e que tenham demonstrado não serem capazes de usar os corticosteroides inalados.
- Montelucaste Vitória ajuda ainda a prevenir o estreitamento das vias respiratórias, que se desencadeia após o esforço físico.

O seu médico decidirá como deve ser usado o Montelucaste Vitória, dependendo dos sintomas e da gravidade da sua asma ou da sua criança.

O que é a asma?

A asma é uma doença de longa duração.

A asma inclui:

- dificuldade em respirar devido ao estreitamento das vias respiratórias. Este estreitamento das vias respiratórias piora e melhora conforme as diversas situações.
- vias respiratórias sensíveis que reagem a várias coisas, como ao fumo de cigarro, ao pólen, ao ar frio ou ao exercício.
- inchaço (inflamação) das paredes das vias respiratórias.

Os sintomas da asma incluem: tosse, respiração difícil e ruidosa (pieira) e sensação de aperto no peito.

2. O que precisa de saber antes de tomar Montelucaste Vitória

Informe o médico sobre quaisquer problemas de saúde ou alergias atuais ou passados, seus ou da sua criança.

Não tome Montelucaste Vitória

- se tem, ou a sua criança tem, alergia ao montelucaste ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de você ou a sua criança tomarem Montelucaste Vitória.

- Se a sua asma ou a respiração, ou da sua criança, piorarem, contacte o médico imediatamente.
- Montelucaste Vitória administrado por via oral não se destina a tratar crises agudas de asma. Se ocorrer uma crise, deve seguir as instruções que o seu médico ou da sua criança deu. Tenha sempre consigo o medicamento inalado que usa para as crises de asma.
- É importante que tome ou a sua criança tome toda a medicação para a asma receitada pelo médico. Montelucaste Vitória não deve ser usado em vez de outros medicamentos para a asma que o médico tenha receitado para si ou para a sua criança.

Os doentes devem ter conhecimento que vários acontecimentos neuropsiquiátricos com Montelucaste Vitória (por exemplo, alterações relacionadas com o comportamento e o humor) foram notificados em adultos, adolescentes e crianças (ver secção 4). Se a sua criança tiver desenvolvido estes sintomas enquanto está a tomar Montelucaste Vitória, deve consultar o médico da sua criança.

Crianças e adolescentes

Não dê este medicamento a crianças com menos de 6 anos de idade.

Tendo em conta o intervalo de idades, estão disponíveis outras apresentações deste medicamento para doentes pediátricos com idade inferior a 18 anos.

Outros medicamentos e Montelucaste Vitória

Informe o médico ou farmacêutico se você ou a sua criança estiverem a tomar, ou tiverem tomado recentemente, ou se vierem a tomar outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Alguns medicamentos podem afetar o modo de atuação de Montelucaste Vitória, ou Montelucaste Vitória pode afetar o modo de atuação de outros medicamentos.

Antes de começar a tomar Montelucaste Vitória, informe o médico se está a tomar ou a sua criança está a tomar os seguintes medicamentos:

- fenobarbital (usado no tratamento da epilepsia),
- fenitoína (usado no tratamento da epilepsia),
- rifampicina (usado no tratamento da tuberculose e de outras infeções).

Montelucaste Vitória com alimentos e bebidas

Montelucaste Vitória 5 mg comprimidos para mastigar não deve ser tomado com alimentos; deverá ser tomado pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois da ingestão dos alimentos.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Montelucaste Vitória.

Gravidez

O médico avaliará se pode tomar Montelucaste Vitória durante este período.

Amamentação

Não se sabe se Montelucaste Vitória aparece no leite materno. Caso pretenda amamentar ou já esteja a amamentar, deve consultar o seu médico antes de tomar Montelucaste Vitória.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não é provável que Montelucaste Vitória afete a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. Contudo, pode variar a forma como cada indivíduo reage à medicação. Alguns efeitos indesejáveis (como tonturas e sonolência) que foram comunicados com Montelucaste Vitória, podem afetar a capacidade de conduzir ou utilizar máquinas em alguns doentes.

Este medicamento contém 1,5 mg de aspartamo em cada comprimido que é equivalente a 1,5 mg/298,15 mg.

O aspartamo é uma fonte de fenilalanina. Pode ser prejudicial se tiver fenilcetonúria (PKU), uma doença genética rara em que a fenilalanina se acumula porque o seu organismo não a consegue remover adequadamente.

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por unidade de dose, ou seja, é praticamente "isento de sódio".

3. Como tomar Montelukaste Vitória

Tomar este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

- Deve tomar, ou a sua criança deve tomar, apenas um comprimido para mastigar de Montelukaste Vitória uma vez por dia, de acordo com as instruções do médico.
- Este deve ser tomado mesmo quando não tem, ou a sua criança não tem, sintomas ou mesmo que surja uma crise aguda de asma.

Em crianças dos 6 aos 14 anos de idade:

A dose recomendada é um comprimido para mastigar de 5 mg por dia tomado à noite.

Durante o tratamento com Montelukaste Vitória, certifique-se de que não toma ou que a sua criança não toma outros medicamentos que contenham a mesma substância ativa, o montelukaste.

Este medicamento é para ser tomado por via oral. Os comprimidos são para ser mastigados antes de engolir. Montelukaste Vitória 5 mg comprimidos para mastigar não deve ser tomado com alimentos, devendo ser tomado pelo menos 1 hora antes ou 2 horas depois da ingestão de alimentos.

Se tomar ou se a sua criança tomar mais Montelukaste Vitória do que deveria

Contacte o médico imediatamente para aconselhamento. Não foram comunicados efeitos indesejáveis na maioria das notificações de sobredosagem. Os sintomas mais frequentemente comunicados devido a sobredosagem em adultos e crianças incluíram dor abdominal, sonolência, sede, dor de cabeça, vômitos e hiperatividade.

Caso se tenha esquecido de tomar ou de dar Montelukaste Vitória à sua criança

Tomar Montelukaste Vitória sempre de acordo com as indicações do médico. No entanto, se falhar uma dose, ou se a sua criança falhar uma dose, volte ao esquema normal de um comprimido para mastigar uma vez por dia. Não tome nem dê à sua criança uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar ou que a sua criança se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar, ou se a sua criança parar de tomar Montelukaste Vitória

Montelukaste Vitória só pode tratar a sua asma ou a asma da sua criança se for tomado continuamente. É importante que Montelukaste Vitória continue a ser tomado durante o tempo que o médico considerar necessário, a fim de manter o controlo da asma. Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Em estudos clínicos realizados com Montelukaste Vitória 5 mg comprimidos para mastigar, os efeitos indesejáveis mais frequentemente comunicados (ocorrem em pelo menos 1 em 100 doentes e em menos de 1 em 10 doentes tratados) que se pensa estarem relacionados com Montelukaste Vitória foram:

- dor de cabeça.

Adicionalmente, foi comunicado o seguinte efeito indesejável em estudos clínicos com Montelukaste Vitória 10 mg comprimidos revestidos por película:

- dor abdominal.

Estes foram normalmente ligeiros e ocorreram com maior frequência nos doentes tratados com Montelukaste Vitória do que com placebo (comprimido sem medicamento).

A frequência de possíveis efeitos indesejáveis listados abaixo é definida de acordo com a seguinte convenção:

- Muito frequentes: podem afetar mais de 1 em 10 pessoas
- Frequentes: podem afetar até 1 em 10 pessoas
- Pouco frequentes: podem afetar até 1 em 100 pessoas
- Raros: podem afetar até 1 em 1.000 pessoas
- Muito raros: podem afetar até 1 em 10.000 pessoas
- Desconhecido: a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis

Adicionalmente, durante o tempo de comercialização do medicamento, foram comunicados os seguintes efeitos:

- infeção respiratória superior (Muito frequente);
- aumento da tendência para hemorragias (Raro);
- reações alérgicas incluindo inchaço da face, lábios, língua e/ou garganta, que podem provocar dificuldades a respirar ou engolir (Pouco frequente);
- alterações de comportamento e de humor [sonhos anómalos incluindo pesadelos, sono];
- agitado, sonambulismo, irritabilidade, ansiedade, inquietude, agitação incluindo comportamento agressivo ou hostilidade, depressão (Pouco frequente); tremores, atenção alterada, memória diminuída (Raro); alucinações,

desorientação, pensamentos e atos suicidas (Muito raro);

- gaguez (Muito raro);
- tonturas, sonolência, dormência e picadas, convulsões (Pouco frequente);
- palpitações (Raro);
- hemorragia nasal (Pouco frequente), inchaço (inflamação) dos pulmões (Muito raro);
- diarreia, náuseas, vômitos (Frequente); boca seca, indigestão (Pouco frequente);
- hepatite (inflamação do fígado) (Muito raro);
- erupções na pele (Frequente), nódulos negros, comichão, urticária (Pouco frequente); pápulas vermelhas dolorosas sob a pele que aparecem mais frequentemente na região anterior da perna (eritema nodoso) reações na pele graves (eritema multiforme), que podem ocorrer inesperadamente (Muito raro);
- dores musculares ou nas articulações, câibras musculares (Pouco frequente);
- febre (Frequente); fraqueza/cansaço, mal-estar, inchaço (Pouco frequente).

Em doentes asmáticos tratados com montelukaste, foram comunicados casos muito raros de um conjunto de sintomas semelhante a gripe, sensação de picadas ou dormência nos braços ou pernas, agravamento de sintomas pulmonares e/ou erupção na pele (síndrome de Churg-Strauss). Consulte o médico imediatamente caso tenha algum destes sintomas (Ver secção 2).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver, ou a sua criança tiver, quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/>
submissaoram
(preferencialmente) ou através dos seguintes contactos:
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53
1749-004 Lisboa
Tel: +351 21 798 73 73
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)
e-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Montelukaste Vitória

Não conservar acima de 30 °C.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL. Os dois primeiros algarismos indicam o mês, os quatro últimos algarismos indicam o ano. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Montelukaste Vitória

- A substância ativa é o montelukaste. Cada comprimido para mastigar contém montelukaste sódico que corresponde a 5 mg de montelukaste.
- Os outros componentes são: manitol, celulose microcristalina, carboximetilamido sódico, óxido de ferro vermelho, aroma de cereja, aspartamo e estearato de magnésio.

Qual o aspeto de Montelukaste Vitória e conteúdo da embalagem

Os comprimidos para mastigar de Montelukaste Vitória 5 mg são avermelhados, cilíndricos, biconvexos, com um código gravado numa das faces. Blisters de Alumínio-Alumínio, em embalagens de 14 e 28 comprimidos para mastigar. É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Faes Farma Portugal, S.A.
Rua Elias Garcia, 28
2700-327 Amadora
Portugal

Fabricante

Laboratórios Cinfa, S.A.
Olaz-Chipi, 10 – Polígono Industrial Areta
31620 Huarte – Pamplona
Espanha

Este folheto foi revisto pela última vez em janeiro de 2023.