

Folheto informativo: Informação para o utilizador
Trausan 100 mg/ml, solução oral
citicolina

Leia atentamente este folheto antes de tomar este medicamento.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o rereer.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é Trausan e para que é utilizado
2. Antes de tomar Trausan
3. Como tomar Trausan
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Trausan
6. Outras informações

1. O que é Trausan e para que é utilizado

Trausan é um medicamento utilizado no:

- Tratamento complementar da deterioração do estado neurológico e cognitivo (capacidades intelectuais) associados a acidentes vasculares cerebrais (isquémicos) na fase aguda, pós-aguda e de reabilitação.
- Tratamento complementar da deterioração do estado neurológico e cognitivo (capacidades intelectuais) associados a traumatismos cranianos.

2. Antes de tomar Trausan

Não tome Trausan

- se tem alergia (hipersensibilidade) à citicolina ou a qualquer outro componente.
- se sofre de hipertonia do parassimpático (aumento anormal da tensão muscular de certas fibras nervosas).

Ao tomar Trausan com outros medicamentos

Trausan solução oral potencia os efeitos da L-dopa.

A citicolina não deve administrar-se concomitantemente com medicamentos que contenham meclofenoxato (centrofenoxina), por possível potenciação do seu efeito.

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Embora os estudos disponíveis não tenham demonstrado efeitos, recomenda-se não administrar a citicolina durante a gravidez ou no aleitamento, exceto nos casos em que os potenciais benefícios superem os riscos. Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de condução e utilização de máquinas.

3. Como tomar Trausan

Tomar Trausan sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Posologia

Adultos: 1 a 2 ml, 2 a 3 vezes ao dia.


Crianças: 1 ml, 2 a 3 vezes ao dia.

Não ultrapassar a dose usual recomendada, salvo indicação médica em contrário.

O início do tratamento e a duração do mesmo dependerá da avaliação clínica do doente pelo médico.

Modo e via de administração

Trausan Solução oral administra-se via oral com a ajuda de seringa doseadora, do seguinte modo:

- Fig. 1
- 
1. Abrir o frasco. O frasco traz uma tampa de segurança infantil e deve abrir-se do seguinte modo: empurrar a tampa plástica de rosca para baixo, enquanto se roda no sentido contrário dos ponteiros do relógio. Introduzir a seringa doseadora com o êmbolo totalmente pressionado.
 2. Aspirar, puxando o êmbolo, a dose pretendida (1 ou 2 ml).
 3. Tomar o medicamento misturando-o com um pouco de água.

Depois de cada administração recomenda-se a lavagem da seringa doseadora com água. Tomar Trausan sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Se tomar mais Trausan do que deveria

Não foram observados casos de sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar Trausan

Retomar a administração do medicamento sem aumentar as doses inicialmente prescritas pelo médico. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Trausan

Não se conhecem quaisquer efeitos de privação resultantes da suspensão do tratamento com Trausan solução oral.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, Trausan pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

A citicolina é, normalmente, muito bem tolerada, mesmo em doses elevadas e usadas prolongadamente. Pode, ocasionalmente, reduzir a tensão arterial de forma discreta e passageira.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Trausan

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Guardar a temperatura não superior a 25 °C

Proteger da luz.

Não utilize Trausan solução oral após o prazo de validade impresso no frasco e na embalagem exterior.

O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.

Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. Outras informações

Qual a composição de Trausan

- A substância activa é a citicolina.

- Os outros componentes são: sacarina sódica, aroma de caramelo, *para*-hidroxibenzoato de propilo, *para*-hidroxibenzoato de metilo, sorbato de potássio, propilenoglicol, etanol, ácido clorídrico, água purificada.

Qual o aspecto de Trausan e conteúdo da embalagem

Trausan apresenta-se em embalagem com um frasco de vidro âmbar transparente de 50 ml, com tampa com sistema de fecho de segurança infantil e uma seringa doseadora. O frasco contém solução oral límpida de cor ligeiramente amarelada doseada a 100 mg/ml de citicolina.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no mercado:

Faes Farma Portugal, S.A.

Rua Elias Garcia, 28

2700-327 Amadora

Fabricante:

Faes Farma, S.A.

Máximo Aguirre, 14

Lejona (Vizcaya) - 48940 · Espanha

Este folheto foi aprovado pela última vez em janeiro de 2023.