

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Venosmil 200 mg cápsula

hidrosmina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico,

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Venosmil e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Venosmil
3. Como tomar Venosmil
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Venosmil
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Venosmil e para que é utilizado

Venosmil contém como substância ativa hidrosmina e está indicada no tratamento dos sintomas da insuficiência venosa crónica dos membros inferiores, incluindo varizes.

Se não se sentir melhor ou se piorar tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar Venosmil

Não tome Venosmil:

- se tem alergia (hipersensibilidade) à substância ativa ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Venosmil.

Venosmil não deve ser usado no tratamento de edema de causa cardíaca, renal ou hepática. Nestes casos o tratamento deve ser dirigido à causa subjacente.

No caso de não se verificar melhoria dos sintomas o doente deve recorrer ao médico.

Outros medicamentos e Venosmil

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não se verificaram incompatibilidades com outros medicamentos.

Venosmil com alimentos

Não se verificaram incompatibilidades com alimentos.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Apesar de nos estudos em animais não se terem observado sinais de teratogenicidade (malformações nos fetos), não foram apresentados estudos em grávidas nem durante a amamentação. Nestas situações o uso do medicamento não é aconselhado durante a gravidez, sobretudo no 1.º trimestre, exceto se os benefícios forem superiores aos riscos.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não aplicável.

3. Como tomar Venosmil

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose recomendada é uma cápsula, três vezes por dia, no momento das principais refeições.

Utilização em crianças: não recomendado a utilização.

Idosos, insuficientes renais ou hepáticos: não foram realizados estudos nestes grupos, como tal, o uso do medicamento fica ao critério do clínico.

Se tomar mais Venosmil do que deveria

Não estão descritos casos de sobredosagem e/ou intoxicação.

Caso se tenha esquecido de tomar Venosmil

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.
Aguarde pelo horário da próxima toma e prossiga o tratamento como indicado pelo médico.

Se parar de tomar Venosmil

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Efeitos secundários possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.
Em raros casos podem verificar-se manifestações cutâneas de tipo alérgico e/ou perturbações gástricas ligeiras.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Também poderá comunicar efeitos secundários diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

INFARMED, I.P.

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil,53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 71 40

Fax: + 351 21 798 73 97

Sítio da internet: <http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage>

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Venosmil

Não conservar acima de 25°C. Conservar na embalagem de origem para proteger da luz e humidade.

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após VAL. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não utilize este medicamento se verificar sinais de deterioração.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Venosmil

A substância ativa é a hidrosmina.

Os outros componentes são: estearato de magnésio, gelatina, eritrosina (E127), amarelo de quinoleína, dióxido de titânio (E171), água purificada.

Qual o aspeto de Venosmil e conteúdo da embalagem

Venosmil apresenta-se em embalagens de 20 ou 60 cápsulas acondicionadas em blister de ALU/PVC/PVDC.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Faes Farma Portugal, S.A.

Rua Elias Garcia, 28

2700-327 Amadora

Fabricante

Faes Farma, S.A.

Máximo Aguirre, 14

Lejona - Leioa 48940 Vizcaya

Este folheto foi revisto em janeiro de 2023.